

[Инструкция Галстена таблетки №48 \(12x4\)](#)

ВНИМАНИЕ! Вся информация взята из открытых источников и предоставляется исключительно в ознакомительных целях.

Галстена таблетки №48 (12x4)



Лекарственная форма: Таблетки

Фармакотерапевтическая группа: Комплексный гомеопатический препарат.

Состав

действующее вещество: 1 таблетка содержит: Carduus D1-7,4 мг, Taraxacum D6 37,2 мг, Chelidonium D6 37,2 мг, Natrium sulfuricum D12 37,2 мг, Phosphorus D12 37,2 мг;

вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, крахмал картофельный, магния стеарат.

Лекарственная форма

Таблетки.

Основные физико-химические свойства: круглые, плоские таблетки белого цвета с возможными вкраплениями с разделительной риской.

Фармакотерапевтическая группа

Комплексный гомеопатический препарат.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Препарат Галстена® имеет свойства гепатопротектора, холеретика и холекинетики.

Препарат оказывает некоторое спазмолитическое и противовоспалительное действие на

гепатобилиарную систему.

Показания

Острые и хронические заболевания печени и желчевыводящих путей. В комплексном лечении хронического панкреатита.

Для гепатопротекции после антибиотикотерапии и других гепатотоксических воздействий.

Противопоказания

Повышенная чувствительность (аллергия) к любому компоненту препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Клинически значимое взаимодействие препарата Галстена® с другими лекарственными средствами не установлена. Препарат можно комбинировать с любыми лекарственными средствами и методами лечения.

Особенности применения

Лекарственная форма таблетки содержит лактозу, поэтому пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции вместо таблеток Галстена® нужно применять препарат в форме капель.

Поскольку Галстена® содержит растительные природные компоненты, при хранении может наблюдаться незначительное изменение вкуса и цвета таблетки, что не приводит к снижению эффективности препарата.

Применение в период беременности или кормления грудью

Информация относительно любого риска для плода и ребенка от применения препарата в период беременности или кормления грудью до настоящего времени не зарегистрирована. Препарат можно применять в период беременности или кормления грудью в случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает возможный риск для плода/ребенка.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами

Препарат не влияет на способность управлять транспортными и механическими средствами.

Способ применения и дозы

Взрослые и дети от 12 лет: по 1 таблетке;

дети в возрасте 5-12 лет: по ½ таблетки.

Принимать препарат 2 раза в сутки.

Для достижения максимального эффекта препарат Галстена® рекомендуется принимать в

промежутках между приемами пищи (за 30 минут до или через 1 час после еды). Таблетку рекомендуется держать во рту до полного рассасывания.

Для ускорения выздоровления в начале лечения, а также в случаях, требующих быстрого устранения симптомов, возможен прием препарата каждые полчаса-час до улучшения состояния, но не более 4 раз в сутки, после чего принимать 2 раза в сутки.

При необходимости для лечения детей до 5 лет следует применять препарат Галстена® в форме капель.

Длительность применения: гепатит, гепатоз, цирроз печени – не менее 3 месяцев.

Хронический холецистит, постхолецистэктомический синдром – 2-3 месяца. При необходимости курс можно повторить через 1 месяц.

При дискинезиях желчевыводящих путей продолжительность курса лечения – 2-3 недели.

Для защиты клеток печени после антибиотикотерапии и других вредных воздействий продолжительность курса – 2-4 недели.

Дети

Для лечения детей в возрасте до 5 лет следует применять препарат Галстена® в форме капель.

Передозировка

Случаи передозировки не обнаружены.

Побочные реакции

В исключительных случаях у лиц с гиперчувствительностью на любой компонент препарата, возможны аллергические реакции.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной картонной упаковке при температуре не выше 30 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 12 таблеток в блистере; по 1 или 2, или 3, или 4 блистера в картонной упаковке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Рихард Биттнер АГ.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Оссиахерштрассе 7, А-9560 Фельдкирхен, Австрия.

Внимание! Текст описания препарата "Галстена таблетки №48 (12х4)" предоставлен для общей информации и ознакомления и является упрощённым вариантом официальной аннотации к лекарству. Перед приобретением и использованием препарата обязательно обратитесь к врачу и получите профессиональные рекомендации. Данный текст размещён на портале сугубо для ознакомительных целей и не может служить основанием для самолечения. Только врач может выносить решение о назначении того или иного лекарства, определять дозу и график приёма.