

[Инструкция Климадинон таблетки, покрытые пленочной оболочкой, №60 \(15x4\)](#)

ВНИМАНИЕ! Вся информация взята из открытых источников и предоставляется исключительно в ознакомительных целях.

Климадинон таблетки, покрытые пленочной оболочкой, №60 (15x4)



Действующее вещество: Прочие половые гормоны и средства, влияющие на половую сферу

Лекарственная форма: Таблетки

Фармакотерапевтическая группа: Статеві гормони та засоби, що впливають на статеву систему. Препарати цимицифуги.

Состав лекарственного средства

действующие вещества: 1 таблетка содержит 20 мг сухого экстракта корневища цимицифуги (*Cimicifuga rhizome*), что соответствует 2,8 мг нативного экстракта (5-10:1); (экстрагент этанол 58 % (об/об));

вспомогательные вещества: лактоза моногидрат, крахмал картофельный, магния стеарат, кальция гидрофосфат дигидрат, тальк, титана диоксид (E 171), железа оксид желтый (E 172), железа оксид красный (E 172), макрогол 6000, аммонийно-метакрилатный сополимер.

Лекарственная форма

Таблетки, покрытые оболочкой.

Круглые двояковыпуклые таблетки, покрытые оболочкой терракотового цвета с гладкой поверхностью.

Название и местонахождение производителя

Бионорика СЕ, Керхенштейнерштрассе, 11-15, 92318, м. Ноймаркт, Германия.

Фармакотерапевтическая группа

Половые гормоны и средства, влияющие на половую систему. Код АТС G03X.

Средство растительного происхождения для лечения климактерических расстройств.

Действующее вещество — экстракт корневища цимицифуги оказывает эстрогеноподобный эффект путем связывания с эстрогеновыми рецепторами. Кроме того, наблюдается уменьшение выделения лютеинизирующего гормона передней долей гипофиза, что может быть связано с влиянием на эстрогеночувствительные клетки гипоталамуса и регуляцией высвобождения им соответствующего рилизинг-гормона. Эстрогеноподобное влияние на организм и уменьшение выделения лютеинизирующего гормона — основные механизмы лечебного действия препарата. Экстракт цимицифуги положительно влияет на нейровегетативную систему и снижает уровень психоэмоциональных расстройств в климактерический период.

Показания для применения

Нейровегетативные расстройства в период менопаузы (приливы, повышенная потливость, нарушение сна, повышенная раздражительность, перепады настроения, апатия и др).

Противопоказания

Индивидуальная повышенная чувствительность к действующему веществу или к другим компонентам препарата. Эстрогензависимые опухоли. Заболевания печени или в анамнезе.

Надлежащие меры безопасности при применении

При появлении признаков поражения печени (утомляемость, потеря аппетита, желтуха, боль в верхней части живота, тошнота, рвота, темная моча) следует прекратить применение препарата Климадинон®.

При нарушении или возобновлении менструаций, а также в случае длительных менструаций или других жалоб, возникающих во время лечения, необходимо обратиться к врачу для пересмотра схемы лечения.

Женщинам репродуктивного возраста необходимо использовать эффективные противозачаточные средства.

Одновременный прием эстрогенов возможен только под контролем врача.

Препарат содержит лактозу, поэтому пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции не следует применять препарат.

Примечание для больных сахарным диабетом. 1 таблетка содержит в среднем 0,01 хлебной единицы (ХЕ).

Применение в период беременности или кормления грудью

Безопасность цимицифуги в период беременности или кормления грудью не установлена, поэтому не следует применять Климадинон® в этот период, или женщинам, которые планируют забеременеть.

Способность влиять на скорость реакции при управлении

автотранспортом или работе с другими механизмами

Не влияет.

Дети

Препарат не применяют детям.

Способ применения и дозы

Если нет особенных указаний врача, препарат принимают по 1 таблетке 2 раза в день (утром и вечером), по возможности в одно и то же время. Таблетки следует глотать не разжевывая и запивать достаточным количеством жидкости.

Терапевтический эффект проявляется приблизительно через 2 недели после начала приема препарата.

Продолжительность курса лечения определяет врач индивидуально. Курс может составлять от 3 до 6 месяцев. Препарат не следует применять дольше 3 месяцев без консультации врача.

Передозировка

Случаи отравления препаратом вследствие его передозировки неизвестны.

Если пациентка приняла дозу препарата, которая значительно превышает рекомендованную, следует обратиться за помощью к врачу. Возможно усиление побочных реакций.

Побочные эффекты

При применении препаратов, которые содержат цимицифугу, редко наблюдались случаи желудочно-кишечных расстройств (диспептические проявления, диарея, тошнота, рвота), аллергические реакции кожи (сыпь, зуд, крапивница), отек лица и периферические отеки, увеличение массы тела, очень редко возникали нарушения функции печени (гепатит, желтуха), в единичных случаях сообщалось об ощущении напряжения в груди и менструальноподобные кровотечения.

В случае возникновения любых побочных реакций следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

При одновременном приеме эстрогенов Климадинон® может усилить их действие.

Срок годности

4 года.

Не применять после окончания срока годности, указанного на упаковке. Срок годности относится к последнему дню месяца.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 15 таблеток в блистере; по 4 блистера № 60 (15x4) в картонной коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Внимание! Текст описания препарата "Климадинон таблетки, покрытые пленочной оболочкой, №60 (15x4)" предоставлен для общей информации и ознакомления и является упрощённым вариантом официальной аннотации к лекарству. Перед приобретением и использованием препарата обязательно обратитесь к врачу и получите профессиональные рекомендации. Данный текст размещён на портале сугубо для ознакомительных целей и не может служить основанием для самолечения. Только врач может выносить решение о назначении того или иного лекарства, определять дозу и график приёма.